

CONSTITUTION DE COMITES THERAPEUTIQUES

Afin d'améliorer la qualité des prestations des structures hospitalières et dans le cadre d'une coopération entre les pharmaciens et les médecins au sein de ces structures la meilleure prise en charge thérapeutique et un usage rationnel des médicaments, vous êtes priés de procéder à la constitution de comités thérapeutiques ayant pour objectifs:

1°/ - ACTION A MOYEN ET LONG TERME

Elaboration de protocoles thérapeutiques adaptés aux structures et aux particularités pathologiques régionales ou locales.

2°/ - ACTION IMMEDIATE

Faire parvenir à la Direction de la Pharmacie et du matériel après adoption par le comité thérapeutique et en tenant compte des différentes constantes, une proposition de nomenclature en vigueur de la structure sanitaire concernée et ce, avant le 31 Décembre.

Engager une réflexion en vue d'étudier les problèmes liés à l'approvisionnement, à la distribution et à la consommation des médicaments au sein de l'Hôpital.

J'attire votre attention sur l'importance que j'attache à la stricte application de la présente circulaire et vous prie de veiller à la stricte application de ces dispositions.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

SIGNE: DALI JAZI

SAIRES/:

DIRECTEURS D'ADMINISTRATION: POUR INFORMATION CENTRALE

DIRECTEURS REGIONAUX	: POUR INFORMATION ET SUIVI
DIRECTEURS D'HOPITAUX	: POUR EXECUTION
MEDECINS CHEFS DE SERVICE	: POUR EXECUTION
PHARMACIENS RESPONSABLES	: POUR EXECUTION

- Soluté alcoolique d'acide borique
- Soluté de bard-parker
- Soluté au bleu de méthylène
- Soluté au citrate de sodium à 4%
- Soluté cuprozinique faible (=eau de dalibour faible)
- Soluté d'alcool camphrée (=eau de vie camphrée)
- Soluté neutre d'hypochlorite de sodium (=Dakin)
- Soluté d'éosine aqueuse à 1%
- Soluté d'eau oxygéné à 10%
- Soluté aqueuse de fluoresceine 1%
- Soluté de mercurésceine sodique
- Fluoresceine alcoolique
- Soluté iodo - iodure fort de 1%
- Soluté aqueux de Milian
- Soluté alcoolique de Milian
- Soluté de Nitrate d'argent à 1%
- Soluté de K_2MnO_4 0,3%
- Soluté buvable de glucose à 30%
- Soluté alcoolique d'acide salicylique à 1%
- Soluté de sulfate de Magnesium
- Soluté phosphaté
- Sirop à l'iodure de potassium
- Sirop au sulfate de zinc
- Sachet au P.E.G. 4 000
- Solution collargol - protargol
- Crème contre les engelures (pommade A + D)
- Solution anti-poux
- Solution de bromoforme composé
- Solution de glycérine boratée
- Liquide de bonin
- Céquartil solution
- Sirop Pectoral adultes et enfants.